

# 和歌山労災病院 化学療法レジメン

疾患名：大腸がん

レジメン名：mFOLFOX6+Pmab療法

1コースの日数：14日

| 薬剤名<br>(溶解液等を含む)          | 投与量                                 | 投与経路                        | 投与時間 | Day |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
|                           |                                     |                             |      | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| グラニセロン点滴静注<br>デキサメタゾン注射液  | 3 mg/100mL<br>9.9 mg                | 点滴静注                        | 10分  | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| パニツムマブ注<br>生理食塩液          | 6 mg/kg<br>100 mL                   | 点滴静注                        | 60分  | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 生理食塩液                     | 50 mL                               | 点滴静注                        | 5分   | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| オキサリプラチン注<br>5% ブドウ糖注射液   | 85 mg/m <sup>2</sup><br>250 mL      | 点滴静注                        | 120分 | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| レボホリナート点滴静注<br>5% ブドウ糖注射液 | 200 mg/m <sup>2</sup><br>250 mL     | 点滴静注<br>(オキサリプラチン注と<br>同時に) | 120分 | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| フルオロウラシル注<br>生理食塩液        | 400 mg/m <sup>2</sup><br>50 mL      | 点滴静注                        | 5分   | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| フルオロウラシル注<br>生理食塩液        | 2400 mg/m <sup>2</sup><br>(合計100mL) | 点滴静注                        | 46時間 | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ヘパリンNaロック用シリンジ            | 1000 単位                             |                             |      |     |   | ○ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

備考

・デキサメタゾン錠 4mg 1錠分1 (朝食後) Day2.3